

Taxon Aphelandra squarrosa

Název taxonu	Aphelandra squarrosa
Vědecký název taxonu	Aphelandra squarrosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Nees (1847)
Český název	afelandra drsná
Synonyma (zahradnický pou..	Aphelandra squarrosa var. leopoldii Van Houtte; Aphleandra leopoldii (Van Houtte) Lowe
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Aphelandra

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a Amazonská oblast
Biogeografické regiony - po..	jihovýchodní Brazílie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý keř stálezelený a Polokeř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktní rostliny, většinou málo větvené, vzpřímené, dorůstající výšky 30-100(-200) cm a 150 cm šířky
Výhony	tlustý vzpřímený kmínek, výrazně sytě červený
Listy	vstřícné; kopinatá, vejčitá až eliptická čepel, 20-30 x 8-14 cm velká, leskle sytě tmavozelená s nápadnou bílou kresbou kolem hlavních listových žilek; řapík asi 3-5 cm
Květenství	přímé terminální květenství, 15-20 cm vysoký klas, žluté barvy
Květy	trubkovité květy, 2,5-3 cm délky, žluté až žlutooranžové barvy; výrazné podpůrné listeny stejné barvy s červeným tónováním, na rostlině vytrvávají déle než trubkovité květy
Opylovací poměry	Samosprašná

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště, ne plné slunce
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; teploty celoročně 18-25 °C; v zimním období vegetačního klidu možno pěstovat při teplotách 12-14 °C
Faktor vody	neustále vlhký kořenový bal; vysoká vzdušná vlhkost; časté rosení i zálivka měkkou vodou o pokojové teplotě; v případě období klidu zálivka omezená
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	duben - prosinec
Použití	okenní vitríny, skleníky, sesazované nádoby, kvetoucí doplněk výsadeb ve sklenících a zimních zahradách; krátkodobá kvetoucí hrnkovka pro doplnění otevřených interiérů
Choroby a škůdci	puklice, vlnatky, třásněnky, svilušky a listové mšice; při trvalém moku nebo vyschnutí kořenového balu může dojít k opadu listů; suchý vzduch podporuje množení škůdců

Množení

Množení	Vegetativní, Řízkování, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	osní řízky s úžlabním pupenem
Odrůdy	‘Louisae’, ‘Leopoldi’ - první, pojmenované podle belgických panovníků. Dnes hlavně odrůdy kompaktní: ‘Dania’, ‘Fritz Prinsler’, ‘Citrina’, ‘Ivo’, ‘Koniger’, ‘Silver Cloud’, ‘Josette’, ‘Brockfeld’, ‘Chrysops’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/100236?tab=references>

Grafické přílohy

