

Taxon *Nepeta racemosa*

Název taxonu	Nepeta racemosa
Vědecký název taxonu	Nepeta racemosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Lam.
Český název	šanta hroznovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Nepeta

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Kavkaz, Írán, Turecko, u nás místy zplanělá

Zařazení

Fytocenologický původ	suché, slunné kamenité svahy, druhotně podél cest, na stráních, v okolí lidských sídel a zahrad
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Chamaefyt
Životní forma - poznámka	u báze dřevnatí,
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	druh vytvářející husté trsy, vysoké 15-40 cm
Výhony	lodyhy vystoupavé až poléhavé, čtyřhranné, načervenalé, hustě jemně chloupkaté
Listy	spolu s lodyhami našedlé, pýřité, vstříčné, řapíkaté, cca 2-3x2-2,5 cm velké, podélně srdčité, puchýřkaté se zubatým okrajem
Květenství	řídce lichoklasý
Květy	kalich nafialovělý, hustě chlupatý, 5 - cípý, horní kališní lístky zakřivené a o trochu větší než dolní, koruna cca 15 mm, modrá se 2 pysky a skvrnitá. Horní pysk 2 laločnatý, spodní 3 laločnatý s miskovitě rozšířeným středním lalokem.
Plody	tvrška
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Říjen

Doba kvetení - poznámka	dlouhá doba kvetení, kvete v několika fázích,
Remontování	✓
Remontování - poznámka	remontování výrazně podpoří seřezání po odkvětu cca o 1/3 až 1/2

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	výžaduje teplé, slunné stanoviště
Faktor vody	propustné i vysychavé půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	koruny suchých zídek, obruby a lemy, výsadby přírodě blízkého charakteru, větší skalky
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování a Dělení trsů
Odrůdy	např. bíle kvetoucí: 'Alba', 'Snowflake', modře kvetoucí: 'Superba', 'Grog'. V zahradnické praxi častější hybridní odrůdy <i>Nepeta xfaassenii</i> (<i>N. racemosa</i> x <i>N. nepetella</i>)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	jaro, podzim
Odkazy	<ul style="list-style-type: none"> • https://botany.cz/cs/nepeta-racemosa/

Grafické přílohy



