

Taxon Clerodendrum thomsoniae

Název taxonu	Clerodendrum thomsoniae
Vědecký název taxonu	Clerodendrum thomsoniae
Jména autorů, kteří taxon p...	Balf. (1862)
Český název	blahokeř Thomsonové
Synonyma (zahradnický pou..	Clerodendron thomsonae
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Volkameria

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast a Konžsko-guinejská oblast
Biogeografické regiony - po..	západní Afrika: Kamerun

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	ovíjivý keř až 4 m, lysý nebo víceméně napurpurověle a drobně pýřitý, obzvláště větévky, řapíky a stopky květenství
Listy	listy až 17 cm dlouhé, vejčité až vejčitě podlouhlé či eliptické, celokrajné, špičaté až krátce zašpičatělé, báze klínovitá až zaoblená, řapíky 6-30 mm dlouhé; tmavozelené, měkké, lesklé
Květenství	terminální a úžlabní vrcholíky, 8-20 ks květů; pýřité
Květy	stopky květů 0,7-1,5 cm; kalich bílý nebo žlutavý, laloky 1,3-2 x 0,5-1,2 cm; koruna jasně až tmavě červená, trubka až 2,5 cm dlouhá, žláznatě pýřitá, laloky až 0,6-1 cm dlouhé, špičaté
Plody	tmavě červené až černé

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla	velmi světlé stanoviště, možné i na přímém slunci
---------------	---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	poloteplý až teplý skleník či interiér; v období vegetace optimální teploty 18-20°C; v zimě teploty 10-15°C, žádoucí dopřát klidové období po dobu 2-3 měsíců pro nasazení květů
Faktor vody	pravidelná rovnoměrná zálivka, v zimě omezit
Faktor půdy	humózní až středně těžký substrát, pH 5,5 až 6,5

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez v březnu silně ořezat a přesunout na teplejší místo

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	jako kvetoucí rostlina pro sesazované nádoby a truhlíky; pro popínání treláží a dalších prvků do zimních zahrad
Choroby a škůdci	listové mšice a puklice

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	řízkování při teplotě 22-25°C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(chladný skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/33700670?tab=references>