

Taxon Vitis vinifera Muromec

Název taxonu	Vitis vinifera Muromec
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Muromec’ (Mu)
Český název	Réva vinná pravá
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o ruskou odrůdu, vznikla křížením odrůd (‘Malingeř’ x ‘Amurskij’) (‘Zabalkanskij’ x ‘Muškát Hamburgský’)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, zašpičatělé
Listy	středně velké, mírně tří až pětilaločnatý, řapíkový výkrojek je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký hrozen, kuželovitý, středně hustý; bobule je velká, oválně podlouhlá, fialovomodrá s ojíněním
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché lehké i těžké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, citlivá k plísni šedé
Plodnost	velmi raná, pravidelná (výnos 5-7 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je chruplavá, růžovobílá, neutrální chuť

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 126)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

