

# Taxon Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora                                    |
| Vědecký název taxonu           | Brassica oleracea var. botrytis subv. cultiflora                                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a> , <a href="#">L.</a> , <a href="#">Alef</a> , <a href="#">L.</a> |
| Český název                    | květák                                                                              |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)                                               |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                                                                |
| Vnitrodruhové jednotky         | convar. botritis var. botritis                                                      |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Brassica</a>                                                            |

## Biogeografické regiony

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Středomoří, Malá Asie |
|-------------------------------|-----------------------|

## Zařazení

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Letnička pravá a Košťálová zelenina             |
| Zařazení podle původu, nár... | pěstuje se pro zdužnatělé fasciované květenství |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Kořen      | slabý kořenový systém |
| Plody      | šešule                |
| Semena     | HTS 3 - 5 g           |
| Vytrvalost | jednoletý             |

## Doba zrání

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Začátek doby zrání    | Květen                                                                   |
| Konec doby zrání      | Říjen                                                                    |
| Doba zrání - poznámka | sklizeň : Raný 20.V. - 15.VI., Letní 15.VII. - 15.VIII., Pozdní IX. - X. |

## Nároky na stanoviště

|                        |                                                                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓                                                                                                                                                       |
| Faktor tepla           | optimální teplota pro růst 12 - 18°C, klíčení 15 - 20°C                                                                                                 |
| Faktor vody            | nutná pravidelná doplnková závlaha                                                                                                                      |
| Faktor půdy            | humózní půdy biologicky činné, hlinité, vododržné, podzimní odrůdy na řepařské půdy, pro rané kvěťáky lehčí, záhřevné písčitohlinité půdy, pH 6,8 - 7,5 |

## Užité vlastnosti

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití                     | zelenina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Choroby a škůdci            | vyslepnutí kvěťáku zúšobené nedostatkem molybdeny, propadání a hnědnutí středu růžic, antokyazace růžic kvěťáků, mechovatění růžic kvěťáku, zlistnatění růžic kvěťáku, vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých ( <i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> ), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i> ), plíseň brukvovitých ( <i>Peronospora parasitica</i> ), alternáiová skvrnitost brukvovitých ( <i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i> ), květílka zelná ( <i>Delia radicum</i> ), mšice zelná ( <i>Brevicoryne brassicae</i> ), dřepčík ( <i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec ( <i>Ceutorhynchus</i> ), bělásek zelný ( <i>Pieris brassicae</i> ), bělásek řepový ( <i>P. rapae</i> ), můra zelná ( <i>Mamestra brassicae</i> ), můra kapustová ( <i>Lacanobia oleracea</i> ), osenice polní ( <i>Agrotis segetum</i> ), zápnředníček polní ( <i>Plutella xylostella</i> ), molice vlašťovičnicková ( <i>Aleyrodes proletella</i> ), bejlmorka zelná ( <i>Contarinia nasturtii</i> ), třásněnka ( <i>Trips</i> spp.) |
| Doporučený spon pro výsad.. | rané 0,4 x 0,4 m, letní 0,5 x 0,5, pozdní 0,5 - 0,6 x 0,5 - 0,6 m, ozimé 0,4 x 0,4 - 0,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Množení

---

Množení      Přímý výsev a Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)