

Taxon *Pisonia umbellifera*

Název taxonu	Pisonia umbellifera
Vědecký název taxonu	Pisonia umbellifera
Jména autorů, kteří taxon p...	(J.R. Forst. et G. Forst.) Seem (1862)
Český název	pisónie
Synonyma (zahradnicky pou..	Ceodes umbellifera J.R. Forst. & G. Forst.; Calpidia excelsa (Blume) Heimerl; Pisonia brunnoniana Endl.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Pisonia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Madagaskarská oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Malesijská oblast, Novokaledonská oblast, Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu, Tasmánská oblast, Holantarktická květenná říše a Novozélandská oblast
Biogeografické regiony - po..	Austrálie: Queensland, Nový Jižní Wales, Ostrov Lorda Howe, Norfolk, Nový Zéland; Mauritius; Indonézie, Malajsie, Filipíny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý strom stálezelený a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stálezelený široce větvený keř nebo strom, výšky 3-6(-28) m, kulovitého tvaru; v interiérech do 2 m
Výhony	kmínky vzpřímené, dřevnaté
Listy	listy vstřícné nebo ve zdánlivých přeslenech, eliptické, vejčité nebo (elipticky) podlouhlé, až 40 x 15 cm, báze široce klínovitá, vrcholek zašpičatělý nebo tupý, 8-10 párů žilek, řapíky až 5 cm dlouhé; kožovité a lesklé
Květenství	terminální latnaté vrcholíky
Květy	drobné, zelené nebo růžové až žluté, 5četné; stopky květů 1,5-6 mm, s 1-3 listenci na bázi nebo výše, trubka květu zvonkovitá, 5-7 mm, hnědochlupatá, vrcholek 5laločný, tyčinek 6-14, nitky nestejně dlouhé, prašníky téměř kulovité, semeníky podlouhlé,

čnělky štíhlé, kvete na jaře
 Plody plody téměř cylindrické, trochu zakřivené, 4-5křídle nebo 4-5žebré, lepkavé, hnědé, 20-40 x asi 6 mm velké

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světломilná, na příliš tmavých stanovištích listy ztrácejí své vybarvení
Faktor tepla	teplý až poloteplý skleník či interiér; teploty v zimě 10-20 °C, optimální 15 °C; citlivě reaguje na podchlazení kořenů
Faktor vody	rovnoměrná vlhkost substrátu; při chladném přezimování velmi opatrná zálivka; při teplém přezimování zvýšená vlhkost vzduchu
Faktor půdy	humózní, dobře provzdušněná půda s přidavkem zahradní zeminy; pH 5,5 - 6,5

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	solitérní rostlina, sesazované nádoby
Choroby a škůdci	štitěnky, puklice a listové mšice v příliš suchém vzduchu; při vysokých zimních teplotách shazuje list

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	na jaře semeny nebo v létě polodřevitými řízky (při teplotě 20-25 °C)
Odrůdy	Variegata' - listy zeleně mramorované, okraj krémově bílý, obzvláště v mládí narůžovělý

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/22500321?tab=references>