

# Taxon Prunus armeniaca ‘Rakovského’

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Prunus armeniaca ‘Rakovského’                |
| Vědecký název taxonu           | Prunus armeniaca                             |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                           |
| Odrůda                         | ‘Rakovského’                                 |
| Český název                    | meruňka obecná                               |
| Autor                          | Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                       |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Prunus</a>                       |

## Biogeografické regiony

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Slovensko, 1954 |
|-------------------------------|-----------------|

## Zařazení

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Fytocenologický původ | nahodilý semenáč |
| Pěstitelská skupina   | Peckovina        |

## Popisné a identifikační znaky

|         |                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus | koruna vznosná, později rozkleslá                                                                                                                                                       |
| Květy   | středně velké, kulovitě oválné, slupka sytě oranžová, krycí barva tmavě červená až fialová, lákavá, povrch je hladký a matný, dužnina sytě oranžová, jemná, dobrá, odlučitelná od pecky |

## Doba zrání

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | dozrává 5 dní po odrůdě 'Velkopavlovická', středně raná |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|

## Nároky na stanoviště

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Faktor tepla | vyžaduje dobré stanoviště                      |
| Faktor půdy  | vyžaduje půdy dobře zásobené živinami a vláhou |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | polokmen, čtvrtkmen                                |
| Podnož          | M-VA-1 až M-VA-3, M-LE-1, 'St. Julien A' a MY-KL-A |

## Užité vlastnosti

|                  |                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choroby a škůdci | proti napadení hnědnutí listů nízká, k nízkým teplotám střední, za deště plody často pukají a jsou napadány moniliózou |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Růstové i jiné druhově spec.. | růst bujný, mírně spurtypový |
| Plodnost                      | velká, méně pravidelná       |

## Množení

---

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Množení | Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace |
|---------|----------------------------------------------------------------------|

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Staniční zkouška 18\)](#)

## Ostatní

---

|          |                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poznámka | Pro svůj líbivý vzhled plodů je oblíbená především u drobných pěstitelů. Plody má atraktivní červené se sytě oranžovou dužninou a velmi dobrou chutí. Je náchylná na pukání a moniliózu plodů za dešťů. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Grafické přílohy

---

