

Taxon Spiraea douglasii

Název taxonu	Spiraea douglasii
Vědecký název taxonu	Spiraea douglasii
Jména autorů, kteří taxon p...	Hook.
Český název	tavolník Douglasův
Synonyma (zahradnický pou..	S. menziesii Hook.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Spiraea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA)
Biogeografické regiony - po..	západ severní Ameriky

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce vystoupavý a dosti hustě větvený opadavý keř, výška 100-250 cm
Výhony	letorosty (červeno)hnědé
Pupeny	střídavé
Listy	listy podlouhlé až eliptické, 3-10 cm, oba konce tupé až zakulacené, horní polovina (hrubě) pilovitá, pod květenstvím také celokrajné, na rubu běloplstnaté a vynikle žilkované
Květenství	květy v úzce kuželovitých, hustých latách 10-20 cm
Květy	květy (purpurově) růžové
Plody	měchýřky pukající břišním švem

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	popř. až IX

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-III
Faktor vody	snese suché stanoviště
Faktor půdy	na půdu nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VII-VIII (IX) - květ
Použití	zpevňování, pokryvná dřevina

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	množení semenem se téměř nepoužívá, převažuje způsob řízkování zelenými či dřevitými řízky, množit lze i přikopčením a následným dělením, avšak je to neefektivní.