

Taxon Prunus armeniaca ‘Shajinhong Sin’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Shajinhong Sin’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Shajinhong Sin’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Čína
-------------------------------	------

Zařazení

Fytocenologický původ	1200 let stará odrůda
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna rozkladitá
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	oválné, zlatočervené (50-75% tvoří líčko), průměrná hmotnost 60 g (v extrému až 100 g), velmi atraktivní, snadná odlučitelnost, refrakce 12° Brix, poměr kyselin a cukrů vyvážený

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	začátek až střed května
-------------------------	-------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec června až začátek července, střední (skladovatelnost 6-7 dní při pokojové teplotě), vývoj plodu trvá 67 dní
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	nesnáší chladné teploty
--------------	-------------------------

Užitné vlastnosti

Použití	vhodná k transportu
Plodnost	poprvé plodí v 7 letech po výsadbě

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -
Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Ostatní

Poznámka Nejvíce se pěstuje v oblasti v Číně, v provincii Shanxi (nejznámější oblast Qingxu County - 89% výnosů). Doporučeno je pěstovat odrůdu v provincii Liaoning, nevhodná do oblastí s příliš chladným počasím (Shenyang).