

Taxon Beta vulgaris Cicla Group

Název taxonu	Beta vulgaris Cicla Group
Vědecký název taxonu	Beta vulgaris
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	Cicla Group
Český název	mangold, cvikla
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	ssp. vulgaris var. cicla
Nadřazená kategorie	Beta

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Listová a stonková zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro řapíkaté listy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce růžice silně řapíkatých listů
Kořen	rozvětvený
Listy	zdužnatělé, křehké, šťavnaté, barva řapíku je odrůdovým znakem
Květenství	1 - 1,5 m vysoké, lata
Květy	žlutozelené, pětidílné
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	třísemenná hnědá klubíčka
Semena	HTS 18 - 20 g
Vytrvalost	dvouletá

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červenec
Konec doby zrání	Říjen
Druhá sklizeň	✓
Druhá sklizeň - poznámka	vhodná postupná sklizeň, 3 až 4 x za vegetaci

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	výsev již při 3 °C
Faktor půdy	nenáročný

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová mozaika okurky (Cucumber mosaic virus - CMV), virová mozaika řepy (Beet mosaic virus - BMV), květílka řepná (Pegomyia hysciami), maločlenec čárkovitý (Atomaria linearis)
Doporučený spon pro výsad..	0,2 - 0,5 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)