

# Taxon *Sedum spathulifolium*

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | <i>Sedum spathulifolium</i>                                                                                         |
| Vědecký název taxonu           | <i>Sedum spathulifolium</i>                                                                                         |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">(Hook.) A.&amp; D.Löve</a>                                                                              |
| Český název                    | rozchodník lopatkolistý                                                                                             |
| Synonyma (zahradnický pou..    | <i>Gormania spathulifolia</i> (Hook.) Á.Löve & D.Löve, <i>Sedum pruinosa</i> Britton, <i>Sedum anomalum</i> Britton |
| Autor                          | Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)                                                                                      |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                                                                              |
| Vnitrodruhové jednotky         | var. <i>pruinosa</i>                                                                                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Sedum</a>                                                                                               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Holartická květenná říše, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA) |
| Biogeografické regiony - po.. | Severoamerické pacifické pobřeží z Oregonu po Kalifornii                                              |

## Zařazení

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fytocenologický původ         | Subtaxony s pomoučenými listy (var. <i>pruinosa</i> ) pouze z oregonských a kalifornských přímořských útesů (cremnofyt), nepomoučené horské populace vystupují ve stinných skalnatých roklich k 1600 m n.m |
| Pěstitelská skupina           | Trvalka stálezelená                                                                                                                                                                                        |
| Životní forma                 | Chamaefyt                                                                                                                                                                                                  |
| Zařazení podle původu, nár... | Di - divoce rostoucí trvalka                                                                                                                                                                               |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | trsnatě polštářovitá trvalka                                                                                                 |
| Kořen            | adventivní, nitkovitý                                                                                                        |
| Výhony           | sterilní vystoupavé se stěsnaně olistěnými vrcholky; kvetoucí vzpřímené s listy vstřícnými, 0.1 m                            |
| Listy            | silně dužnaté - klínovitě lopatkovité, lysé, purpurově nabělé a často silně bíle pomoučené, nahloučené v apikálních růžicích |
| Květenství       | vidlanovitě větvená, bratkeatní, až s třiceti květy                                                                          |
| Květy            | žluté, pětičetné, hvězdčovitě rozevřené, diplostemonické se žlutými prašníky                                                 |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                  |
| Plody            | drobné hnědé měchýřky bez okrasné hodnoty                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semena                     | velmi drobná, žlutohnědá                                                                                                                            |
| Možnost záměny taxonu (+.. | podobná <i>Gormaniana oregana</i> (Nutt.) Britton má leskle zelené, v zimě červenající listové růžice a zvonkovitě sevřené květy s kýlnatými petaly |
| Dlouhověkost               | nepříliš dlouhověká                                                                                                                                 |

## Doba kvetení

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Začátek doby kvetení | Červen   |
| Konec doby kvetení   | Červenec |

## Nároky na stanoviště

|                            |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce     | ✓                                                                              |
| Faktor světla - poznámka   | heliofyt                                                                       |
| Faktor tepla               | mrazuvzdorná do -18°C (USDA)                                                   |
| Faktor vody                | xerofyt                                                                        |
| Faktor půdy                | propustné, živinami chudé, kyselé (pH 4.5-6.5)                                 |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓                                                                              |
| Faktor půdy - poznámka     | dobře drenážované, ale nepříliš vysychavé substráty - špatně snáší zimní vlhko |

## Užitné vlastnosti

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití - pro trvalky           | KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum |
| Použití - pro trvalky - pozná.. | Hensen & Groendijk-Wilders: vynikající ( 'Cape Blanco ' ), velmi dobrá ( 'Purpurea ' ), obě také AGM 1981; Sieber: upotřebitelná pro zahrádkáře                                                                                                                      |
| Použití                         | skalky, suché zídky, extenzivní střešní zeleň, sesazované nádoby, floristické zpracování                                                                                                                                                                             |
| Doporučený spon pro výsad..     | 36 - 44 rostlin na m2                                                                                                                                                                                                                                                |

## Množení

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky a Množení oddělků                                |
| Množení - poznámka | nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřík segmentů (extenzivní střešní zeleň) |
| Konečné hrnky      | 6 - 8 cm                                                                                 |
| Retardace          | ne                                                                                       |
| Květní tvorba      | exaktní data nedostupná                                                                  |

Odrůdy několik odrůd lišících se velikostí, vybarvením a pomoučením listů - téměř bílé 'Cape Blanco', červeně probarvené 'Red Raver', 'William Pascoe' atd.

## Ostatní

---

### Odkazy

- Denton M.F. (1982): Revision of Sedum section Gormanina (Crassulaceae). Brittonia 34 (1): 48-77; Hensen K.J.W., Groendijk-Wilders N. (1984): An account of some Sedums cultivated in Europe. Plantsman 8 (1): 1-20; Sieber J. (1989): Sichtung des Sedum-Sorti

## Grafické přílohy

---



