

Taxon Petroselinum crispum conv. radicosum

Název taxonu	Petroselinum crispum conv. radicosum
Vědecký název taxonu	Petroselinum crispum
Jména autorů, kteří taxon p...	Miller, Nyman ex A. W. Hill, Alef.,...
Český název	Petržel kořenová
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. radicosum
Nadřazená kategorie	Petroselinum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	oblast Středozemního moře
-------------------------------	---------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	pro konzumní část se pěstuje jako jednoletá, pro osivo jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro kořen

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kořene vyrůstá růžice listů
Kořen	dužnatý, kónický, krátký až dlouhý, pokožka žlutavě bílá nebo i světle hnědá, dužnina smetanově bílá
Listy	dlouhé řapíkaté, 2-3krát zpeřené s výrazným aromatem
Květenství	dutý rýhovaný a rozvětvený květný stonek, vysoký 0,8 - 1,2 m, květenství složený okolík
Květy	žlutavě zelené, z části obojaké, zčásti prašníkové
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	žebnatá aromatická dvojnažka barvy zelenohnědé, HTS 1,3 - 1,5 g
Semena	hnědé, rýhované s háčkem, HTS 0,7 - 1,5 g
Vytrvalost	dvouletá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červenec
Konec doby zrání	Listopad

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	náročná v období po výsevu a na začátku tvorby kořenů, vláhová potřeba za vegetaci 120 - 160 mm
Faktor půdy	lehčí, propustné půdy písčito hlinité nebo hlinito písčité, dobře zásobené humusem

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	virová tenkolistost mrkve (Carrot thin leaf virus - CTLV), virová červenolistost mrkve (Carrot red leaf virus - CRLV), virová strakatost mrkve (Carrot motley virus - CMoV), padlí miříkovitých (Erysiphe heraclei), černá hniloba mrkve (Alternaria radicina), alternárióvé skvrnitosti listů mrkve (Alternaria dauci), alternárióvá skvrnitost listů petržele (Alternaria petroselini), septoriová skvrnitost listů petržele (Septoria petroselini), háďatko severní (Meloidogyne hapla), mšice mrkvová (Semiaphis dauci), mšice hlohová (Dysaphis crategi), dutilka hlohová (Prociphilus pini), merule mrkvová (Trioza apicalis), vrtule celerová (Eluleia heraclei), pochmurnatka mrkvová (Psila rosae)
Doporučený spon pro výsad..	0,03 - 0,06 x 0,4 - 0,45 m

Množení

Množení	Přímý výsev
---------	-------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)