

Taxon *Paeonia suffruticosa* 'Hatsugarasu'

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | <i>Paeonia suffruticosa</i> 'Hatsugarasu' |
| Vědecký název taxonu | <i>Paeonia suffruticosa</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | Andrews |
| Odrůda | 'Hatsugarasu' |
| Český název | pivoňka keřovitá |
| Synonyma (zahradnicky pou.. | <i>Paeonia arborea</i> Donn, <i>Paeonia moutan</i> Sims |
| Autor | Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Nadřazená kategorie | Paeonia |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | první známé dokumenty o tomto kultivaru pocházejí z roku 1929 z Japonska, ale tato odrůda byla vyšlechtěna již před 1929, šlechtitel neznámý |

Zařazení

| | |
|---------------------|--|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý a Léčivá rostlina |
| Životní forma | Fanerofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|--------------|---|
| Habitus | středně vysoké rostliny, vzpřímené, polosloupovité, výška do 1,5 m, řidce větvený, pomalu rostoucí |
| Kořen | ztlustlý, hlízovitý |
| Výhony | štíhlé ve srovnání s původním druhem, lysé, dřevnaté |
| Pupeny | velké, střídavé |
| Listy | střídavé, 2 x trojčetné, dlouhé, malé, řídké, lístky eliptické, až vejčité, terminální lístek nepravidelně zubatý, tmavě zelené s načervenalým nádechem |
| Květenství | jednotlivě, postranní |
| Květy | velké, kompaktní, poloplné, tmavě červené, v průměru 15 - 20 cm x 6 cm, na dlouhé stopce |
| Plody | měchýřek, podlouhlý, plstnatý, dřevnatějící |
| Semena | semena až do 10 mm velká, lesklá, tmavá |
| Kůra a borka | šedohnědá |
| Doba rašení | Na jaře rašící (IV) |

Doba kvetení

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení | Červen |
| Remontování | ✓ |
| Remontování - poznámka | možnost remontování v srpnu |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor tepla | zóna 5-6, mrazuvzdorná |
| Faktor vody | ne zaplavované, podmáčené půdy |
| Faktor půdy | neutrální |

Užité vlastnosti

| | |
|------------------|--|
| Použití | okrasný keř - solitera, skupiny, podrost, léčivá rostlina |
| Choroby a škůdci | Plíseň pivoňková (<i>Botrytis paeoniae</i>), Cladosporiová listová skvrnitost a červená stonková skvrnitost (<i>Cladosporium paeoniae</i>), Septoriová listová skvrnitost (<i>Septoria paeoniae</i>), Hniloby kořenů |

Množení

| | |
|--------------------|--|
| Množení | Přímý výsev, Řízkování, Kořenové řízky, Hřížení, Dělení trsů, Roubování, Roubování - Kozí nožka a Roubování - Do rozštěpu |
| Množení - poznámka | výsev semen hned po sběru, jinak přeléhání 1-3 roky - nutná stratifikace |
| Květní tvorba | potřebuje nízké teploty |
| Odrůdy | Dle původu odrůd - Japonské, Čínské, Evropské, Americké, Dle tvaru květu: Jednoduchý typ, Poloplný typ (lotosové, chryzantémové), Japonský typ (květ zlatého středu, vlastní japonský, sankovitý), Plný typ (růžovitý, bombovitý, zlatého kruhu, kulovitý) |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2007

Výsev/výsadba na stanoviš... březem-dubem, místo roubování 5 - 10 cm pod povrchem půdy,
výsadba - šikmo, výměna substrátu, úprava PH

Grafické přílohy

