

Taxon Caragana frutex

Název taxonu	Caragana frutex
Vědecký název taxonu	Caragana frutex
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) K. Koch
Český název	čimišník křovitý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Caragana

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Východní Evropa, Kavkaz, Střední Asie, Mongolsko

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce ažploše kulovitý a hustě větvený výběžkatý keř
Výhony	výhon hnědý
Pupeny	pupeny šedé
Listy	sudospeřené, větreno někdy tmovatí
Květy	žlutý, po 1 na stopečce, 2 cm
Plody	lusk

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	teplomilná, oplast I-III
Faktor vody	sušší půda
Faktor půdy	lehká, suchá a na živiny nepříliš bohatá půda

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez netvaruje se

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ
Použití	keřové skupiny
Choroby a škůdci	netrpí

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	množíme semenem nebo i úspěšně zelenými řízky, kultivary můžeme roubovat na <i>C. arborescens</i> , např. pro dosažení stromkovitého tvaru
Odrůdy	Pendula' - vzácněji poléhavě plazivý, těsně při zemi přitisklý, nejčastěji je však pěstován jako nízký stromek s převisajícími větvemi