

Taxon Spinacea oleracea

Název taxonu	Spinacea oleracea
Vědecký název taxonu	Spinacea oleracea
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	Špenát
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Spinacia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Střední Asie
-------------------------------	--------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
---------------------	--

Popisné a identifikační znaky

Habitus	přízemní růžice listů
Kořen	silný křulovitý kořen, 0,3 - 0,4 m, málo větvený
Listy	oválný tvar, špičatý, laločnatý či hrálovitý, světle nebo tmavězelená, hladké i bublinaté
Květenství	za dlouhého dne, původně dvoudomé, květní stonek 0,7 m vysoký
Květy	samčí květy tvoří přetřhaný klas, samičí tvoří klubička v paždí listů, oboje květy jsou velmi drobné
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	ostrosemenná nebo kulatosemenná nažka
Semena	HTS 9 - 13 g
Vytrvalost	jednoleté

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	poměrně nízké, klíčí od 2 - 30 °C, růst 5 - 24 °C, optimum 15 - 18 °C, při klíčení pod 5 °C možnost vybíhat do květu, dobře vyvinuté rostliny snášejí - 9 °C
Faktor půdy	neutrální nebo mírně alkalické, citlivé na utužení půdy, vhodné jsou lehčí půdy s dostatkem humusu, k zasolení relativně tolerantní

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
---------	----------

Choroby a škůdci virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), plíseň špenátu (Perenospora spinaciae), skvrnitost listů špenátu (Cladosporium variabile var. spinaciae), mšice maková (Aphis fabae), květílka řepná (Pegomyia hyoscyami), maločlenec čárkovitý (Atomaria linearis)

Doporučený spon pro výsad.. 0,15 - 0,2 x 0,2 m

Množení

Množení Přímý výsev

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnici... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)