

# Taxon Cavolo laciniata

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Název taxonu         | Cavolo laciniata                      |
| Vědecký název taxonu | Cavolo laciniata                      |
| Autor                | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie            | <a href="#">Druh</a>                  |

## Biogeografické regiony

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Středozeří, Itálie |
|-------------------------------|--------------------|

## Zařazení

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Dvouletka pravá a Košťálová zelenina                        |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá |
| Zařazení podle původu, nár... | pěstuje se pro silně zkadeřavené listy                      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | různě vysoký košťál růžice listů                                      |
| Kořen            | hlouběji zasahující                                                   |
| Listy            | laločnaté, listová čepel zkadeřavená, tmavě sivozelená, výrazná žebra |
| Opylovací poměry | Cizosprašná                                                           |
| Plody            | šešule                                                                |
| Vytrvalost       | dvouletý                                                              |

## Doba zrání

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Začátek doby zrání    | Září         |
| Konec doby zrání      | Prosinec     |
| Doba zrání - poznámka | 90 - 160 dní |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                        |
| Faktor světla - polostín | ✓                                        |
| Faktor tepla             | snáší -12 až -15 °C                      |
| Faktor půdy              | pH 6,3 - 7,8, vhodná bramborářská oblast |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Použití          | zelenina                                                        |
| Choroby a škůdci | nekrózy vnitřních listů hlávek, okrajové nekrózy (spály) listů, |

bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (*Xantomonas campestris* pv. *campestris*), nádorovitost brukvovitých (původce *Plasmodiophora brassicae*), plíseň brukvovitých (*Peronospora parasitica*), alternáriová skvrnitost brukvovitých (*Alternaria brassicicola* a *A. brassicae*), květ ilka zelná (*Delia radicum*), mšice zelná (*Brevicoryne brassicae*), dřepčík (*Phyllotreta* ssp.), krytonosec (*Ceutorhynchus*), bělásek zelný (*Pieris brassicae*), bělásek řepový (*P. rapae*), můra zelná (*Mamestra brassicae*), můra kapustová (*Lacanobia oleracea*), osenice polní (*Agrotis segetum*), zápníček polní (*Plutella xylostella*), molice vlaščičnicková (*Aleyrodes proletella*), bejlmorka zelná (*Contarinia nasturtii*), třásněnka (*Trips* spp.)

Doporučený spon pro výsad.. polovysoký 0,4 - 0,5 x 0,5 m, vysoký 0,5 - 0,6 x 0,6 m

## Množení

---

Množení      Přímý výsev a Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)