

Taxon Prunus armeniaca ‘Vemina’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Vemina’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Vemina’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Slovensko
-------------------------------	-----------

Zařazení

Fytocenologický původ	kříženec ‘Rakovského’ x ‘Arzami’ x ‘Zard’
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně vzrůstná, vytváří rozložené koruny; květní pupeny jsou rozloženy na trnech i na jednoletém dřevě
Plody	kulovité, středně velké až velké (50-60 g), souměrné, základní barva slupky je oranžová, překrytá výrazným červeným líčkem, hladká, dužnina je světle oranžová s přechodnou texturou, pevná, dobře oddělitelná od pecky, chuť je velmi dobrá, sladká s typickým aroma, plody jsou mimořádně pevné a dobře snáší i delší přepravu

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně brzy, kvete dva dny před ‘Velkopavlovická’
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	zraje 1-4 dny po odrůdě ‘Velkopavlovická’, středně raná odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	středně odolná proti mrazu v květu, vhodná do všech meruňkářských oblastí
Faktor půdy	bez speciálních nároků

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož	dle stanoviště vhodné všechny podnože
--------	---------------------------------------

Užitné vlastnosti

Použití	především konzervace, dále přímý konzum
Choroby a škůdci	zdravotní stav stromů je velmi dobrý, mimořádná náchylnost na výskyt houbových chorob nebyla zjištěna
Plodnost	středně raná, stabilnější úrody dává na lokalitách s pozdějším nástupem vegetace

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Staniční zkouška 17\)](#)

Ostatní

Poznámka	Patří k odrůdám s raným začátkem kvetení a pozdějším termínem dozrávání plodů. Plody se vyznačují velmi dobrou chutí, dobře snášejí transport.
----------	--

Grafické přílohy

