

Taxon Nidularium billbergoides

Název taxonu	Nidularium billbergoides
Vědecký název taxonu	Nidularium billbergoides
Jména autorů, kteří taxon p...	(Schult. f.) L.B. Sm. (1931)
Český název	nidulárium
Synonyma (zahradnicky pou..	Aechmea billbergioides (Schult. f.) Baker; Canistropsis billbergioides (Schult. f.) Leme
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Nidularium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a oblast Guyanské vysočiny
Biogeografické regiony - po..	východní Brazílie

Zařazení

Fytocenologický původ	deštné až horské lesy do výšky 2000 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	epifyt s plochou nálevkovitou růžicí; nálevka průměru 40-60 cm
Výhony	silně zkrácený stonek s listy, které tvoří listovou růžici
Listy	40 x 2-4 cm velké, zelené, lesklé, lysé, zašpičatělé, na okrajích jemně zubaté, tuhé až kožovité
Květenství	složený hrozen na 20- 25 cm dlouhém stvolu
Květy	trojčetné, trubkovité, přisedlé; korunní lístky zaoblené, 2 cm velké, bílé; listeny citrónově žluté, až 7 cm velké
Možnost záměny taxonu (+..	velmi podobné rodu Neoregelia, od nichž se liší tím, že jejich listy jsou na zašpičatělé

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	celoročně světlé, ne na plném slunci
Faktor tepla	teplý skleník; v létě 20-25 °C, v zimě by neměly klesnout pod 18 °C, krátkodobě poklesy k 12 °C
Faktor vody	celoročně vyrovnaná zálivka měkkou vodou o pokojové teplotě;

	zálivka rovněž dovnitř nálevky; vysoká vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní, hrubě vláknitý substrát z rašeliny, rašeliníku, bukového listí a vloček pěnového polystyrenu; pH 5,0 - 5,5
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	okenní vitríny a uzavřené zasklené prostory; v bytových podmínkách krátkodobá hrmkovka okrasná květem
Choroby a škůdci	puklice a třásněnky v příliš suchém vzduchu; hniloba při chladném a vlhkém substrátu, zasychání listů v suchém vzduchu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	výsevem ihned po sklizni při 27 °C; dostatečně vzrostlými odnožemi, které kvetou po 2-3 letech
Odrůdy	‘Citrina’ - žluté listeny v květenství; ‘Atropurpureum’ - listy i listeny tmavě rudě fialovo hnědé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/4301627?tab=references>

Grafické přílohy

