

Taxon Vitis vinifera Rosler

Název taxonu	Vitis vinifera Rosler
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Rösler´ (Ro)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Kl. 1358-1-47
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o rakouskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Zweigelt rebe´ x (´SV 18 402´ x ´Frankovka´)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má bujný růst
Výhony	jednoleté réví je silnější, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké až velké, pětilaločnaté, s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, lehce otevřený; povrch listu je světle zelený, jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, křídlatý, středně hustý hrozen; má středně velké kulaté bobule, modročerné barvy
Semena	středně velké, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou sušší i kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední vedení i vyšší tvary
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolnost proti houbovým chorobám je střední, citlivější je na plíseň réвовou
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno je ovocné, plné, se zvýrazněnou tříslovinou, tmavě červené barvy
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína i rosé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 93)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

