

Taxon Berberis thunbergii

Název taxonu	Berberis thunbergii
Vědecký název taxonu	Berberis thunbergii
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Odrůda	‘Red Chief’
Český název	dříšťál Thunbergův
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Berberis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
------------------------	------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	Japonsko
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kulovitý, hustě větvený keř, 1-1,5 m
Výhony	výhony hranaté sytě červeně hnědé (mahagonové), jednoduché ostny (mladé semenáčky mají i 3-četné) stejné barvy jako větvička
Pupeny	střídavé pupeny
Listy	listy vejčité, opakvejčité nebo kopistovité, 5-35 mm, ve svazečcích, světle zelené, celokrajné, rub modrozelený, na podzim šarlatově červené a oranžové
Květenství	krozen po 2-5 květech
Květy	květy hned po rašení, žluté, 7-10 mm široké, vně někdy červenavé
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	plody elipsoidní, 8-10 mm, šarlatově červené
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I.-III. (IV.)
Faktor vody	snese sušší půdy
Faktor půdy	nenáročný, neutrální pH

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	nevyžaduje, ale snáší ho velmi dobře - vhodný do stříhaných živých plotů
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V - kvetení a rašení, podzim - oranžové, červené zbarvení
Použití	solitéra, do keřových skupin, živé ploty volně rostoucí i tvarované, velmi častý, typický pro pozdní socialistický realismus
Choroby a škůdci	netrpí

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	Roubování: Roubovanci rychle narostou, avšak podnož vždy podrůstá. Pro vzácné druhy je to však možnost, jak snadno a rychle získat množitelský nebo semenný materiál. Lepší roubovat na jinak zbarvenou podnož - snáze se pak rozliší podrůstající výhony.
Odrůdy	Atropurpurea' - běžný, listy purpurově červené až červenohnědé, podzimní zbarvení svítivě karmínové, 'Atropurpurea Nana' - nízký, 40 cm, červenolistý, 'Aurea' - listy citrónově žluté až zlatožluté, 'Minor' - asi 50-150 cm vysoký, vícekmenný, kompaktní, kulovitý; listy velmi světle zelené, 'Red Chief' - listy purpurově hnědočervené, 2m, 'Kobold' - zakrslá, zelenolistá forma, široce kulovitá, sotva přes 40 cm vysoká