

Taxon Spiraea x vanhouttei

Název taxonu	Spiraea x vanhouttei
Vědecký název taxonu	Spiraea x vanhouttei
Jména autorů, kteří taxon p...	(Briot) Zabel
Český název	tavolník Houtteův
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Spiraea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	vyšlechtěn 1862 (S. cantoniensis x S. trilobata)
-------------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý široce rozložitý, ploše kulovitý keř, výška do 2 m
Výhony	letorosty lysé a zelenohnědé
Pupeny	střídavé
Listy	listy eliptické, vejčité, vejčitě kosočtverečné až obvejčité, 2-4 cm, slabě 3-5laločné, vroubkovaně až zastřihovaně pilovité, na rubu šedozelené, lysé
Květenství	asi 5 cm velké
Květy	květy čistě bílé, 8 mm široké, tyčinek 20-22, jsou někdy částečně sterilní
Plody	měchýřky pukající břišním švem

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II (III)
Faktor vody	snese sušší půdy
Faktor půdy	nenáročná

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řez snáší dobře, lze i tvarovat

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... V-VI - květ

Použití v době květu velmi efektní, jako solitera nebo na okrajích skupin či v živém plotu, meliorační dřevina, snáší znečištěné ovzduší

Množení

Množení Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky

Množení - poznámka množíme převážně zelenými či dřevitými řízky