

Taxon Cichorium intybus var. foliosum f. capitata

Název taxonu	Cichorium intybus var. foliosum f. capitata
Vědecký název taxonu	Cichorium intybus var. foliosum f. capitata
Jména autorů, kteří taxon p...	L., Hegi
Český název	čekanka salátová hlávková
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. foliosum forma capitata
Nadřazená kategorie	Cichorium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Evropa, Asie a severní Afrika, současná kulturní forma Itálie
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Listová a stonková zelenina
---------------------	---

Popisné a identifikační znaky

Habitus	růžice listů tvořící různé hlávky
Kořen	plytká kořenová soustava, křivý kořen krátký
Listy	dle typu odrůdy
Vytrvalost	dvouleté

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	sklízí se za 2 - 3 měsíce od výsadby
-----------------------	--------------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, roste již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), padlí čekanky (Erysiphe cichoracearum)

Doporučený spon pro výsad.. červené typy 0,3 - 0,45 x 0,25 m, typ Zuckerhut 0,4 - 0,5 x 0,3 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)