

Taxon Vitis vinifera Nativa

Název taxonu	Vitis vinifera Nativa
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Nativa’ (Na)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	L 3-10-34
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Fratava’ x ‘Merlan’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví silné, červenohnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, slabě troj až pětilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitě válcovitý hrozen, často s křídélkem, poměrně hustý; bobule je malá až střední, kulatá, modročerná
Semena	středně velká, hruškovitá, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cerason (má širší hrozen a hladší povrch listů)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vododržné půdy, nesnáší sucho
Faktor půdy	hlinité, hlinitojílovité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	do těžších půd T 8B, Börner, do lehčích pak CR 2 a Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolná k houbovým chorobám, citlivější k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno výrazně tmavě červené barvy, odrůdové ovocné až květinové vůně a kořenité chuti
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 19, 20, 21)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

