

Taxon *Lagurus ovatus*

Název taxonu	Lagurus ovatus
Vědecký název taxonu	Lagurus ovatus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	zaječí ocásek vejčitý
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lagurus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Středomoří; druhotně rozšířen do mnoha oblastí světa; ojediněle se vyskytující jako zavlečený i v ČR

Zařazení

Fytocenologický původ	primárně osídluje otevřené plochy - kamenité stráně, písčiny u moře, podél cest
Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Životní forma	Terofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	měkce chlupatá, trsnatá tráva, v pěstování v době květu nejčastěji 50 - 60 cm vysoká
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, 20 - 40 cm dlouhá, nevětvená nebo už od báze rozvětvená, hustě jemně pýřitá
Listy	světle zelené, hustě šedě sametově chlupaté, asi 20 cm dlouhé a 1 cm široké.
Květenství	vejčité asi 1,5 - 6 cm dlouhé, vzpřímené lichoklasy s vlnatými plevy klásků a s jemnými dlouhými osinami zprvu zelenými, později stříbřitými.
Květy	lichoklas s osinami
Plody	obilka
Vytrvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon; vyžadující předpěstování
Faktor vody	zahradní půda s občasnou zálivkou; k sušší půdě tolerantní
Faktor půdy	živné, propustné, písčitohlinité i chudší půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - vyhnívá

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh..	v období kvetení, kdy mají lichoklasy stříbřitou barvu, poté přecházejí do nevzhledné hnědé barvy
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití	Solitérní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - sklízíme když jsou lichoklasy vybarvené do stříbřité barvy.
Růstové i jiné druhově spec..	cenná pro atraktivní květenství a měkkou vlnatou texturu
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ve skleníku s výsevem čistěných semen nebo celých klásků či jejich částí začátkem dubna; lze i z přímého výsevu - není spolehlivé, taxony jsou slabší a později kvetou
Odrůdy	‘Fontaine’ - bohatě kvetoucí kultivar s načechralým květenstvím