

Taxon Ziziphus jujuba

Název taxonu	Ziziphus jujuba
Vědecký název taxonu	Ziziphus jujuba
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill.
Český název	Čínská datle
Synonyma (zahradnický pou..	cicimek, čínská datle, cicimek datlový, jujuba
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ziziphus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Čína
-------------------------------	------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jádrovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, strnule větvený keř nebo až 8 m strom
Listy	eliptické, asi 3 cm dlouhé
Květenství	žlutý vrcholík
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	veliké, oválné, slupka nahnědlá až tmavě červená, lesklá, dužnina masitá, krémově bílá, sladká, navinulé chuti, konzistencí i chutí připomíná čerstvé datle, mimořádně chutné, plody na stromě vydrží i celou zimu, obsahují vysoký podíl vitamínu C (250-3 000 mg/1 kg)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	konec dubna až začátek května
-------------------------	-------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	polovina září až začátek října
-----------------------	--------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	mrazuodolná
Faktor vody	rostlina toleruje sucho, vhodná do slunných (i stinných a polostinných míst), nezamokřených stanovišť

Faktor půdy nenáročná na půdu, lépe snáší hlinitopísčité

Užitné vlastnosti

Použití plody, semena a kůra jako léčivo (nespavost, krevní tlak, tlumí kašel, zpomalují stárnutí, na Ukrajině pomáhají při léčení následků ozáření), sirupy, kompotování, kandování (vysoký obsah cukru), konzumují se především sušené kvůli lepší chuti

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Množení - poznámka lze i semeny

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Před genofondem meruněk, u plotu.\)](#)

Ostatní

Poznámka Může sloužit jako okrasný strom (lomené záhyby u větví). Zajímavostí u tohoto druhu jsou listy. Obávají látky, které tlumí receptory vnímání sladkosti, kdy po rozkousání listu nevnímáme jistou dobu sladkou chuť (cukr se konzistentně jeví jako písek).

Grafické přílohy



