

Taxon Vitis vinifera Cab cubin

Název taxonu	Vitis vinifera Cab cubin
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Cabernet Cubin’ (CC)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	We 70-281-35
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Frankovka’ x ‘Cabernet Sauvignon’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávajcí
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, spíše celokrajné s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý překrytý s průsvitem; povrch listu je světleji zelený, slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší kuželovitě-válcovitý hrozen, středně hustý; má menší kulaté bobule, modrofialové barvy
Semena	malá, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cabernet Sauvignon (CC má hustší olistění a malé listové výkroje)
Vytřvalost	ano

Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová barvířková odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, citlivější na padlí révové
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má tmavou barvu, výrazné třísloviny a aroma po odrůdě Cabernet Sauvignon
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 91\)](#)

Grafické přílohy

