

Taxon Lepismium houletianum

Název taxonu	Lepismium houletianum
Vědecký název taxonu	Lepismium.houletianum
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lemaire) Barthlott (1987; 1858...
Synonyma (zahradnický pou..	Rhipsalis regnellii Lindb.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. regnellii (Lindb.) Kimnach (pro Rhipsalis)

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše a oblast temperátních jihoamerických lesů
Biogeografické regiony - po..	Brazílie (z Minas Gerais do Paraná a St.Catarina) a přilehlá území Argentiny

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt - deštné a mlžné lesy formace mata atlântica mezi 400-1800 m
Pěstitelská skupina	Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Pěstitelská skupina - pozná..	epifytický kaktus okrasný listem a plodem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	mezotonicky větvený epifyt s plochými, článkovanými, visícími stonky
Kořen	často vzdušné kořeny v místech větvení
Výhony	ploché, až 2 m dlouhé, nečlánkované a poměrně tenké, bledě zelené a sivě ožíněné, ostře pilovité s drobnými areolami v zářezech
Listy	sotva patrné štětinkaté osténky na areolách (často zcela chybí)
Květenství	květy soliterně na areolách v zářezech stonků
Květy	oboupohlavné, zvonkovité, neveliké, poniklé s 10-15 krémovými (před odkvětem žlutnoucími) tepaly a mnoha bílými tyčinkami na spodních semenících s 3-6-ramennou bliznou
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	oválně okrouhlé bobule velikosti hrachu, růžové, červené nebo černé
Semena	drobná, hladká, černohnědá

Možnost záměny taxonu (+..	blízké <i>L. warmingianum</i> (K.Sch.) Barthlott má stonky silnější a jen mělce vroubkované
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Říjen
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	v domovině kvete v průběhu deštivého období

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	optimum 16-32 klux, toleruje 64 klux a více (stonky však nepěkně červenají), k dlouhodobému udržení kvality v bytech 1-2 klux
Faktor tepla	množení 22°C-26°C, poté dle dostupnosti světla 18°C-28°C/18°C
Faktor vody	mesofyt, stejnoměrná vlhkost substrátu, toleruje občasné vyschnutí
Faktor půdy	produkce zpravidla v baltské rašelině s borkou, perlitem, pH 6.0-7.0

Užité vlastnosti

Choroby a škůdci	bakterie (<i>Erwinia</i> , <i>Xanthomonas</i>), rzi (<i>Uromyces</i>) a početné deuteromycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Ceratocystis</i> , <i>Rhizoctonia</i> , <i>Sclerotia</i> , <i>Acremonium</i> , <i>Cephalosporium</i> , <i>Cercospora</i> , <i>Myrothecium</i> , <i>Pythium</i>); ze škůdců mšice (<i>Rhopalosiphum</i> , <i>Myzus</i>), štítenky (<i>Pinnaspis</i>)
------------------	---

Množení

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Konečné hrnky	13 cm, 17 cm hrnky nebo závěsné košíky dle velikosti produktu
Retardace	ne
Květní tvorba	pravděpodobně krátkodenní, exaktní data nedostupná, pro produkci nicméně bezvýznamná
Doba kultivace	ve 13-14 cm hrmkách z vrcholových řízků šest až osm měsíců

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada -](#)

Ostatní

Poznámka tradičně řazené k rodu *Rhipsalis*, recentně přesouvané k rodu *Pfeiffera*, molekulární data (Calvente & al. 2011; Korotkova & al. 2011) nicméně podporují separaci do samostatného rodu, sesterského rodu *Hatiora*

Odkazy

- Taylor N., Zappi D. (2004): Cacti of Eastern Brazil. Royal Botanic Gardens, Kew. -- Calvente A. & al. (2011): Molecular phylogeny, evolution, and biogeography of South American epiphytic cacti. *International Journal of Plant Sciences* 172(7): 902-914.

Grafické přílohy

