

Taxon Vitis vinifera Cab sauvignon

Název taxonu	Vitis vinifera Cab sauvignon
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Cabernet Sauvignon’ (CS)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Petit Cabernet, Petite Vedure, Petit Bouchet, Kaberne Sovinjon
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o francouzskou odrůdu, vznikla spontánním křížením odrůd ‘Cabernet Franc’ x ‘Sauvignon’

Zařazení

Fytoceologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě kaštanové, čárkované, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, široké, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté, hluboce vykrajované, bazální výkroj je uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, spodní strana listu je ochlupená
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý hrozen, středně hustý až řidší; bobule je malá, kulatá, tmavě modré barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, světle hnědá, zobáček je krátký
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední až vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnoží do sušších a vápenějších půd Fercal, Binova a CR 2, pro úrodné a vyšší tvary Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci citlivá k houbovým chorobám, odolnější k plísni šedé
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 5 - 9 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína víno obsahuje více tříslovin, má specifickou odrůdovou chuť po zelených papričkách či černém rybízu
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková červená vína, rosé, barrique

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 124\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

