

Taxon Malus domestica 'Idared'

Název taxonu	Malus domestica 'Idared'
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Idared'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Malus silvestris var. domestica, Malus dasycphylla var. domestica, Malus domestica, Malus paradisiaca, Pyrus malus L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	USA, Idaho, Výzkumná stanice zemědělská v Moscow
-------------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	křížení 'Jonathan' x 'Wagenerovo'
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna kulovitá s obrostlými větvemi svěšenými dolů, zahuštěná krátkými plodonoši
Listy	středně velké, oválné až dlouze eliptické, povrch zborcený, lesklý, tmavě zelené
Květy	středně velké až větší, ploše miskovité, korunní plátky velké, ploché až miskovité, oválné, bílé, s okraji výrazně růžově žilkovanými; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou 'James Grieve', 'Coxova reneta', 'Mac Intosh', popř. 'Jonathan'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velké (165-180 g), ploše kulovité, zelenožluté s jasným červeným překrytím, středně šťavnaté a aromatické
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, květy, tvar a velikost listů a znaky a vlastnosti plodu.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	raná, 6. 5. - 16. 5.
-------------------------	----------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka polovina září (skladování do dubna), zimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla vhodná do všech oblastí
Faktor půdy polopropustné půdy s dostatkem živin a vláhy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení čtvrtkmen, především zákrsek, hodí se do ovocných stěn, pro pásové výsadby
Řez vhodný průklest, později středně hluboké zmlazení
Podnož vhodné jsou podnože typu J-TE-E, J-TE-H, J-OH-A, M 9, M 26, M 4, MM 106, M 7

Užitné vlastnosti

Použití konzum, transport
Choroby a škůdci málo odolná proti houbovým chorobám, padlí i ke strupovitosti, netrpí skládkovými chorobami, velmi náročná na chemickou ochranu
Růstové i jiné druhově spec.. růst středně bujný, později méně bujný a v plné plodnosti slabě
Plodnost brzká, velká, při probírce pravidelná, 15-20 t/ha

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Je jednou z nejvíce pěstovaných odrůd jak v tržním ovocnářství, tak i na zahrádkách na vhodných stanovištích při důsledné ochraně proti padlí.

Grafické přílohy

