

Taxon Cordyline fruticosa

Název taxonu	Cordyline fruticosa
Vědecký název taxonu	Cordyline fruticosa
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) A. Chev. (1919)
Český název	dračinka křovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Cordyline terminalis (L.) Kunth; Convallaria fruticosa L.; Dracaena terminalis (L.) L.; Asparagus terminalis L.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cordyline

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indická oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Malesijská oblast, Novokaledonská oblast, Polynézska oblast, Havajská oblast, Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu, Holant arktická květenná říše a Novozélandská oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie, ostrovy Malajsie, Nová Guinea, severovýchod Austrálie, Nový Zéland, Polynésie, Hawai

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	pomalu rostoucí stálezelený, vzpřímený keř, výška 2-4 m, v kultuře maximálně 1m
Kořen	bílý, ztlustlý
Výhony	jednoduché nebo řídce větvené kmínky v trsech
Listy	široce nebo podlouhle kopinaté, lesklé, sytě zelené, 30-60 x 5-10 cm velké, zelené nebo s purpurovým nebo červeným nádechem, u báze zaškrbené
Květenství	bohatě větvené laty až 60 cm dlouhé
Květy	trubkovité, do 1 cm délky; narůžovělé až fialové
Plody	bílé kulovité tobolky

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlé stanoviště, ne však plné slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	celoročně teploty 18-22 °C, v zimě poklesy až k 15 °C
Faktor vody	substrát rovnoměrně vlhký; stálá vysoká vlhkost vzduchu
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí zahradní zeminy; pH 5,8 - 6,5

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	várazné solitérní rostliny okrasné listem pro teplé prostory; květinová okna a vitríny, teplé zimní zahrady
Choroby a škůdci	svilušky a třásněnky; v příliš suchém vzduchu a při vyschnutí kořenového balu se tvoří na listech hnědé skvrny (zasychání listů)

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky
Množení - poznámka	osní řízky (se 3-5 očky, vodorovně založené do písku); vrcholové řízky při 30-35 °C
Odrůdy	'Amabilis' - listy široké, leskle zelené s bronzovou a červenou kresbou; 'Baby Ti' - miniatura; listy zeleně měďnaté a červeně lemované; 'Baptisii' - listy tmavě zelené, mají růžové a žluté proužky a skvrny; 'Firebrand' - růžice kompaktní; listy tmavě vínově zbarvené; 'Guilfoylei' - listy na obou koncích protažené, s červenými, růžovými nebo bílými proužky, řapíky a báze listů bílé; 'Hawaiian Bonsai' - kompaktní; listy tmavě karmínové; 'Imperialis' - listy červeně nebo růžově skvrnitě, sytě zelené; 'Madame Eugene André' - rozkladitá; listy široké, tmavě zeleně měďnaté, okraj červený, nové listy růžové; 'Margaret Storey' - kompaktní; listy zeleně měďnaté a růžově a červeně stříkané; 'Mayi' - listy v mládí červené, později zelené s červeným okrajem; 'Negri' - listy velké, tmavě měďnatě kaštanové; 'Norwoodiensis' - listy zelené se žlutými proužky, okraje a řapíky karmínové; 'Tricolor' - listy trojbarevné

Celky sbírek

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/18401647?tab=references>
- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=14826>

Grafické přílohy



