

# Taxon *Raphanus sativus* var. *major* var. *niger*

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Raphanus sativus var. major var. niger |
| Vědecký název taxonu           | Raphanus sativus                       |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L., A. Voss, Mill.</a>     |
| Český název                    | Ředkev                                 |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)  |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                   |
| Vnitrodruhové jednotky         | var. major, var. niger                 |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Raphanus</a>               |

## Biogeografické regiony

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | oblast Středozemního moře a Přední Asie |
|-------------------------------|-----------------------------------------|

## Zařazení

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Letnička pravá a Kořenová zelenina          |
| Zařazení podle původu, nár... | pěstuje se pro zdužnatělý kořen a hypokotyl |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus    | listová růžice                                                                                                                                                              |
| Kořen      | konzumní část tvoří zdužnatělý kořen a hypokotyl různého tvaru i barvy, evropské odrůdy mají barvu dužniny bílou, odrůdy východoasijské červenou, zelenou nebo dvoubarevnou |
| Listy      | lyrovité, dělené listy, na nervatůře s chloupkami                                                                                                                           |
| Květenství | za dlouhého dne, květní lodyha dosahuje výšky 1,6 m, vybíhání je podporováno i nízkými teplotami od 2 - 11 °C, působící po dobu 2 týdnů                                     |
| Květy      | bílé až růžové, snadno se spráší s ředkvičkou                                                                                                                               |
| Plody      | nečláňkovaný st ruk                                                                                                                                                         |
| Semena     | HTS 8 - 10 g                                                                                                                                                                |
| Vytrvalost | jednoletá                                                                                                                                                                   |

## Doba kvetení

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Doba kvetení - poznámka | za dlouhého dne |
|-------------------------|-----------------|

## Doba zrání

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | sklizeň u jarních odrůd je 50 - 60 dní, u letních 60 - 90 dní, u podzimních 100 -120 dní, japonské odrůdy asi o 14 dní delší |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

vegetaci

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓

Faktor vody při nedostatku srážek nutná závlaha

Faktor půdy nenáročná, možnost pěstovat ve všech zelinářských oblastech, středně těžké půdy

## Užitné vlastnosti

---

Použití zelenina

Choroby a škůdci černání kořenů ředkví a ředkviček (*Aphanomyces raphani*), bílá puchýřnatost brukvovitých (dříve plíseň bělostná - *Albugo candida*), květílka zelná (*Delia radicum*), mšice zelná (*Brevicoryne brassicae*), dřepčík (*Phyllotreta* spp.)

Doporučený spon pro výsad.. 0,15 x 0,35 m

## Množení

---

Množení Přímý výsev

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevniho postupu\)](#)