

Taxon Vitis vinifera Lena

Název taxonu	Vitis vinifera Lena
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Lena’ (Le)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	PE-2/67
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Lipovina’ (Hárslevelű) x ‘Irsai Oliver’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je hladký, spodní strana na žilnatinách lehce ojiňená
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, válcovitě-kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule kulatá, středně velká, žlutozelená
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Irsai Oliver’ (Lena později dozrává, hrozen má kratší stopku)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivá zejména k houbovým chorobám, napadána hmyzem
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 7-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	víno vůně muškátové, do citrusových plodů (limetky); chuť lehčí, s nižším obsahem kyselin
Doporučená technologie vína	jakostní, přívlastková bílá vína a cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

