

Taxon Vitis vinifera Cvetocnyj

Název taxonu	Vitis vinifera Cvetocnyj
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Cvetočnyj’ (Cv)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Cvetočnyj, Cvetochny
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o ruskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Severnyj’ x ‘Muškát bílý’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst s hustým olistěním
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavěji hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	středně velké, trojlaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, otevřený; povrch listu je hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký hrozen, válcovitě kuželovitý, hustý; bobule je středně velká, kulatá, zelenožlutá
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až nižší
Faktor vody	méně vhodné jsou suché a štěrkovité půdy
Faktor půdy	nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na tažně
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA, do hlubších humóznějších půd SO 4 a CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vyšší odolnost k houbovým chorobám, citlivější na padlí révové
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno má lehce muškátovo bezovou vůni i chuť, je svěží s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 43\)](#)

