

Taxon Clematis montana ‘Rubens’

Název taxonu	Clematis montana ‘Rubens’
Vědecký název taxonu	Clematis montana
Jména autorů, kteří taxon p...	E.H.Wilson
Odrůda	‘Rubens’
Český název	plamének horský
Synonyma (zahradnický pou..	Clematis montana subsp. montana var. rubens, Clematis montana var. grandiflora
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Clematis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	introdukován Z Číny kolem roku 1900 Ernestem Wilsonem

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 8 - 10 m, popínavý
Výhony	mladé výhony zprvu trochu chlupaté, brzy celé lysé
Pupeny	vstřícné, malé, kuželovité, hustě bíle plstnaté, umístěné těsně pod ovíjivým vytvářejícím řapíkem
Listy	listy 3četné, lístky krátce řapíčkaté, vejčité až (vejčitě) kopinaté nebo oválné až eliptické, 3-10 cm dlouhé, zařezávaně zubaté nebo vzácně celokrajné, špičaté až zašpičatělé, lysé, olistění v mládí napurpurovélé, posléze bronzově zelené až sytě tmavě zelené, řapíky 5-9 cm dlouhé, červenavě růžové
Květenství	laty
Květy	okolo 5 cm široké, po 1-5, tepaly oválné až eliptické, 18-30 × 5-25 mm velké, stopky květů a květy (5-6 cm široké) mají červenavě růžové
Plody	nažky vejčité, obvejčité, smáčkly okrouhlé až eliptické, 3-5 mm dlouhé, s péřnatým přívěskem 25-40 mm dlouhým
Kůra a borka	hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilný,
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilný, vyžadují však přistínění kořenů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 5 - 7
Faktor vody	vlhko, ne však příliš zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, vhodné jsou živné, ne těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	nevyžaduje, kvete na ložském dřevě
-----	------------------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	léto - výrazné květy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, trvalkové záhony, vyžaduje oporu
Choroby a škůdci	Vadnutí Plaménku (Phoma clematidina): Rychlé odumírání listů, celých výhonů i rostlin. Padlí (Erysiphe polygoni): Bělavý povlak na listech měkkých výhonech i květech. Plíseň šedá (Botrytis cinerea): Poupata, květní stopky i stonky hnědnou, hnědý povlak plísně. Antraknoza Plaménku (Matssonina clematidis): Tmavěhnědé až černé skvrny často se šíří od čepele až podél středu listu. Mšice, Slimáci.

Množení

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary rodu Clematis řízkování zelenými řízky, na řízku ponecháváme min. 1 pár listů, řízky s bočním poraněním, méně rozšířenou metodou je robování, jako podnože je možno využít C. montana nebo jiných botanických druhů

Celky sbírek

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Výsev/výsadba na stanoviš... VII/2020

Poznámka matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)

Odkazy

- <http://www.clematisinternational.com>
- <http://www.guernsey-clematis.co.uk>
- <http://www.parkon.cz>
- <http://www.databaze.dendrologie.cz>
- <http://www.clematis.hull.ac.uk>