

Taxon *Sparmannia africana*

Název taxonu	Sparmannia africana
Vědecký název taxonu	Sparmannia africana
Jména autorů, kteří taxon p...	L. f. (1781)
Český název	Lípěnka africká
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Sparmannia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Usambarská oblast, oblast Namibie a Karoo, Kapská květenná říše a Kapská oblast
Biogeografické regiony - po..	jižní Afrika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velký vícekmenný keř nebo stromek, výška 3–7 m; relativně rychle rostoucí
Výhony	výhony měkce chlupaté
Listy	střídavé; široce vejčité až srdčité vejčité, 15–25 cm dlouhé, na silných výhonech i větší; od báze 3–9nervé, svrchu jasně zelené, naspodu matně světle zelené; velmi nestejně zubaté, vrcholek špičatý až zašpičatělý, báze hluboce srdčitá; oboustranně s dlouhými a měkkými chlupy; řapíky 10–15 cm dlouhé
Květenství	cca 20 květů v úžlabním či terminálním vrcholíku
Květy	květy bílé, dekorativní, až 3,5 cm široké; oboupohlavné, 4četné, sepaly úzce kopinaté, petaly obvejčité, na okraji zvlněné; tyčinky početné a volné, sterilní tyčinky žluté, fertilní s purpurovými prašníky
Plody	téměř kulovité pukavé tobolky, pokryté dlouhými tmavými štětinami, mají asi 2 cm v průměru včetně štětín
Kůra a borka	kůra zelenavě šedá až světle hnědá, hladká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Listopad

Konec doby kvetení Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	celoročně velmi světlé a vzdušné, ne přímé slunce
Faktor tepla	poloteplý až studený skleník či interiér; teploty v zimě 7-12 °C,
Faktor vody	vydatná zálivka; při chladném přezimování jen mírná zálivka; na teplejších stanovištích rosení měkkou vodou
Faktor půdy	humózní a propustný substrát s podílem zahradní zeminy; pH 6,2 - 7,0

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez snáší dobře zpětný řez na jaře

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	okázalá nádobová rostlina a solitéra pro velké a světlé zimní zahrady, verandy, chodby a haly
Choroby a škůdci	třásněnky, molice, mšice; žloutnutí listů v zakouřených prostorech nebo v chladném a vlhkém substrátu na zimním stanovišti; opad listů v průvanu nebo suchu

Množení

Množení	Vegetativní, Bylinné řízky a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	řízkováním pozdě na jaře (při teplotě 20 °C)
Odrůdy	Plena' - habitus i listy jako původní druh, ale květy plné; 'Variegata' - listy bíle panašované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Poznámka sparmánie; "pokojová lipka"

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/32200552?tab=references>

