

Taxon Prunus padus

Název taxonu	Prunus padus
Vědecký název taxonu	Prunus padus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	střemcha hroznovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Padus avium Mill., Prunus racemosa Lam., Prunus vulgaris Borkh.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom (jen vyjímečně keř), vysoký 10 - 17 m, s kuželovitou, později však klenutější korunou
Kořen	srdčitý
Výhony	letorosty v mládí chlupaté, později hladké a lysé, leskle hnědé
Pupeny	velmi štíhlé a špičaté, přitisklé
Listy	obvejčitě nebo podlouhle eliptické, s krátkou, ale tenkou špičkou, na bázi obvykle téměř okrouhlé, 5-9 cm dlouhé a přibližně 3-7 cm široké, na okraji jemně pilovité, na líci matně tmavozelené, na rubu světlejší. Řapíky asi 2 cm dlouhé, s 1-3 terčovitými žlázkami
Květenství	štíhlý hrozen
Květy	bílé, v hroznech 7 - 12 cm dlouhých, většinou nících, složených z četných, asi 20 - 40 květů, kolem 18 cm dlouhých
Plody	kulovité nebo jen málo podlouhlé peckovice, asi 7 mm tlusté, černé, poněkud lesklé
Semena	pecka je pokryta malými důlky
Kůra a borka	hladká, velmi temně hnědošedá nebo téměř černá, rozemnutá nepříjemně páchne
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus virginiana (plody červeno-černé, pecička hladká, list vespod

namodralý)

Doba rašení

Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení

Duben

Konec doby kvetení

Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla

světломilný, snáší zástín

Faktor světla - slunce

✓

Faktor světla - polostín

✓

Faktor světla - poznámka

dokáže růst v podrostu

Faktor tepla

otuzilá dřevina, oblasti I-IV, vůči klimatickým extrémům je velmi odolná

Faktor vody

vyžaduje dostatek půdní vláhy, dává přednost polohám s vysokou hladinou spodní vody

Faktor půdy

hluboké půdy, velmi bohaté na živiny

Faktor půdy - poznámka

nesnese kyselé a zrašelinělé

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...

na podzim žlutě barví

Použití

v parcích jen jako podrost v krycích skupinách na vlhkých místech, pro krajinářské úpravy

Růstové i jiné druhově spec..

velmi vonné a krásné květy, podzimní zbarvení žluto-oranžové, snese znečištěné ovzduší

Množení

Množení

Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování

Množení - poznámka

kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním, kultivary roubojeme na P. avium

Odrůdy

‘Colorata’ - velký keř, nebo stromek, výhony a listy tmavě purpurové přes celou sezónu, kvete růžově v dubnu; ‘Nana’ - 3 - 4 m vysoká, zakrslá hustá, listy menší než u druhu, kvete bohatěji než druh; ‘Plena’ - květy velké poloplňné, kvete dlouho; ‘Summer Glowe’ - strom nebo keřovitý strom, listy při rašení bronzově zelené, později purpurově hnědé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Velký okruh / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)