

Taxon Fraxinus ornus

Název taxonu	Fraxinus ornus
Vědecký název taxonu	Fraxinus ornus
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	jasan zimnář
Synonyma (zahradnicky pou..	Ornus europaea
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Fraxinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	suché a kamenité výslunné svahy

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom, někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	pomalu rostoucí stromek 7-8 m vysoký, koruna vejčitá, hustá
Výhony	šedé, lysé výhony
Pupeny	šedohnědé nebo šedofialové
Listy	lichozpeřené, dlouhé 12-30 cm, ze 7 lístků, jsou vejčité, 3-10 x 2-4 cm velké, nepravidelně pilovité, tmavě zelené, řapíčkaté, naspodu podél středního žebra hnědavě pýřité, koncový lístek je obvejčitý
Květenství	bohaté, mnohokvěté 6-15 cm dlouhé laty z terminálního pupenu
Květy	bílé, vonné, pentlicovité korunní plátky o průměru 1 cm, Fraxinus excelsior - ale má větší vzrůst; pupen černý; lístky po 9-11; květy bezobalné
Plody	úzce podlouhlé, čárkovité nebo kopinaté křídlaté nažky, 2-4 cm délky, křídlo v horní třetině nejširší, zploštělé embryo
Kůra a borka	šedá kůra hladká do vysokého věku
Možnost záměny taxonu (+..	Fraxinus excelsior)ale má větší vzrůst; pupen černý; lístky po 9-11; květy bezobalné)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	semena se sklízí v září a říjnu
-----------------------	---------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilný druh, v mládí snášející slabý zástín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	není příliš mrazuvzdorný, oblasti I-II, na vápencích až do III
Faktor vody	vydrží extrémní nedostatky vláhy a snese vysychající skalnaté podklady
Faktor půdy	náročný na živnost půdy, dává přednost bazickým podkladům, optimum je na vápencích
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	na podzim barví hnědožlutě
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	doplňková dřevina, aleje
Růstové i jiné druhově spec..	výrazné smetanové květy, menší vzrůst

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Roubování, Roubování - Kopulace a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka	kultivary roubujeme, jako podnož volíme F. ornus, slouží jako podnož pro všechny jasany sekce Ornus
Odrůdy	'Variegata' - list žlutě panašovaný; Fraxinus ornus 'Pendula', větve většinou převisající

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)