

Taxon Vitis vinifera Portugal sedy

Název taxonu	Vitis vinifera Portugal sedy
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Portugalské šedé’ (PŠ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Portugal šedý, Rané šedé, Grauer Portugieser, Oporto Szuerke
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší evropská odrůda, křížení není známo (patně jde o pupenovou mutaci z Portugalu modrého či šedého)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světleji hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	malé, zahrocené
Listy	velké, mělce tří až pětilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, většinou lehce překrytý; povrch listu je světle zelený, lehce vrázcitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, šedavé barvy
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zahnutým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Modrý Portugal (PB má šedavou barvu bobulí)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	spraše, písčitohlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 5 BB nebo CR 2, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 či Teleki 5C

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	odolnost k houbovým chorobám je nízká
Plodnost	raná, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno je lehčí, s nižší kyselinkou, ovocné vůně i chuti s nádechem žlutého melounu
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 94, 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

