

Taxon Vitis vinifera Gocseji

Název taxonu	Vitis vinifera Gocseji
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Göcseji zamatos’ (GZ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Rita, Egri csillagok 34, Ecs-34
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o maďarskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Villard Blanc’ x ‘Merlot’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	širší, špičaté
Listy	středně velké, okrouhlé, pětilaločnaté s mírnými až středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je lehce puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký hrozen, kuželovitý, hustý; bobule je středně velká, kulatá, žlutozelená
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou těžké a vlhké půdy
Faktor půdy	nejlépe záhřevné hlinitopísčité až kamenité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na tažně
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4 i CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová muškátová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až vyšší odolnost k houbovým chorobám, citlivá však na plíseň šedou
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-14 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína	víno má výrazně muškátovou vůni i chuť a vysoké kyseliny
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková vína, kupáže, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 130)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

