

Taxon Solanum pseudocapsicum

Název taxonu	Solanum pseudocapsicum
Vědecký název taxonu	Solanum pseudocapsicum
Jména autorů, kteří taxon p...	L. (1753)
Český název	lilek višňový; lilek korálový
Synonyma (zahradnický pou..	Solanum hendersonii W. Wight; Solanum capsicastrum Link ex Schauer; Solanum diflorum Vell.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Solanum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Madagaskarská oblast
Biogeografické regiony - po..	Madagaskar; druhotně tropické oblasti světa

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	rostlina okrasná plody
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	lysé keře nebo keřky, měkce dřevnaté, vzpřímené, až 120(-200) cm vysoké
Výhony	výhony vystoupavé, šedavé, zdánlivě lysé, ale velmi drobně pýřité, alespoň v mládí
Listy	řapíkaté; čepel eliptická nebo (široce) kopinatá či elipticky vejčitá, celokrajná, 1-10 cm dlouhá, báze klínovitá nebo protažená, sbíhavá, vrcholek špičatý nebo tupý; řapíky 0,2-1,5 cm dlouhé
Květy	úžlabní; stopkaté, jednotlivě nebo po 2-3 ks, 1,0-1,5 cm v průměru, stopky květů 6-7 mm; kalich 3-4 mm dlouhý, laloky kopinaté; koruna bílá nebo slézová, kolovitá, 8-15 mm v průměru, trubka krátká, laloky vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, asi 6 × 2,5 mm velké, lysé; prašníky oranžovožluté, asi 2,5 mm dlouhé, podlouhlé, čnělky asi 5 mm
Plody	bobule; jasně oranžové nebo šarlatové, elipsoidní až kulovité, 1-2 cm v průměru; na rostlině vytrvávají do zimy
Semena	semena početná a zploštělá, téměř ledvinitá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až slunné, vzdušné
Faktor tepla	studený skleník či interiér; přes zimu nepříliš teplé, 10-15 °C; letnění
Faktor vody	v létě vydatná zálivka, v zimě omezená, aby kořenový bal nevyschl
Faktor půdy	humózní substrát s příměsí vřesovky, listovky, pařeništní zeminy a písku; pH 5,8 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	květen až prosinec
Použití	hrnkovka okrasná květem a plodem na okna; nádobová rostlina pro chladné prostory
Choroby a škůdci	listové mšice, molice, svilušky a třásněnky na teplém stanovišti; žloutnutí listů na tmavém místě, opad listů v průvanu nebo při přemokření substrátu
Růstové i jiné druhově spec..	jedovatá

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Bylinné řízky
Množení - poznámka	semenem ve skleníku (II-III), na jaře bylinnými řízky
Odrůdy	Cherry Jubilee' - plody bílé, žluté a oranžové; 'Giant Red Cherry' - plody až 25 mm velké, oranžově šarlatové; 'Patersonii' - habitus zakrslý, rozkladitý, plody početné; var. Pseudocapsicum - kmínky, listy a květenství olýsávající

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/29600302?tab=references>

- [http://www.tropicos.org/Name/29600302?
tab=chromosomecounts](http://www.tropicos.org/Name/29600302?tab=chromosomecounts)