

# Taxon Allium ascalonicum

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Název taxonu                   | Allium ascalonicum                    |
| Vědecký název taxonu           | Allium ascalonicum                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Strand.</a>               |
| Český název                    | cibule šalotka                        |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                  |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Allium</a>                |

## Biogeografické regiony

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Biogeografické regiony        | Mediterránní oblast     |
| Biogeografické regiony - po.. | původ není přesně známý |

## Zařazení

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Trvalka zatahující a Cibulnatá rostlina |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | Cibulová zelenina                       |
| Zařazení podle původu, nár... | vytrvalá mrazuvzdorná rostlina          |

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Habitus    | cibule podlouhlé, člunkovitého tvaru |
| Listy      | listy podobné listům pažitky         |
| Vytrvalost | vytrvalá mrazuvzdorná                |

## Doba zrání

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Začátek doby zrání    | Květen                    |
| Konec doby zrání      | Červenec                  |
| Doba zrání - poznámka | za 110-120 dní od výsadby |

## Nároky na stanoviště

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓                                       |
| Faktor tepla           | mrazuvzdorná                            |
| Faktor vody            | snáší suché polohy lépe než cibule setá |
| Faktor půdy            | lehčí půdy, pH 6-7,5                    |
| Faktor půdy - poznámka | zařazuje se do II. a III. třetí         |

## Užité vlastnosti

|         |          |
|---------|----------|
| Použití | zelenina |
|---------|----------|

|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choroby a škůdci              | virová žlutá zakrsllost česnekovitých, plíseň cibule, fuzariové hniloby česnekovitých, květílka cibulová, vrtalka pórová |
| Růstové i jiné druhově spec.. | člunkovitý tvar cibule                                                                                                   |
| Doporučený spon pro výsad..   | 0,25x0,1m                                                                                                                |

## Množení

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Množení            | Přímý výsev a Předpěstování sadby  |
| Množení - poznámka | vedlejší cibulky                   |
| Doba kultivace     | 110-120 dní                        |
| Odrůdy             | nejsou žádné zapsané odrůdy ve SOK |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu, 2012 u genofondu lékořice\)](#)