

# Taxon Brassica oleracea convar. capitata var. capitata

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Brassica oleracea convar. capitata var. capitata  |
| Vědecký název taxonu           | Brassica oleracea var. capitata                   |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L., Alef, L.</a>                      |
| Český název                    | zelí hlávkové                                     |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)             |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                              |
| Vnitrodruhové jednotky         | convar. capitata var. capitata, subvariety: alba, |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Brassica</a>                          |

## Biogeografické regiony

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | Středozeří, východní Evropa, Asie |
|-------------------------------|-----------------------------------|

## Zařazení

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina           | Dvouletka pravá a Košťálová zelenina                        |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá |
| Zařazení podle původu, nár... | pěstuje se pro hlávku tvořenou svinutím listů               |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Habitus          | vytváří hlávku svinutých listů |
| Kořen            | malý kořenový systém           |
| Opylovací poměry | Cizosprašná                    |
| Plody            | šešule                         |
| Vytrvalost       | dvouletý                       |

## Doba zrání

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Doba zrání - poznámka | rané 100 -150 dní, polorané 130 - 180 dní, pozdní 150 - 250 dní od výsevu |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

## Nároky na stanoviště

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓                                           |
| Faktor vody            | 60% VVK, v době narůstání hlávek 20 - 25 mm |
| Faktor půdy            | těžší, vododržné, pH 6,3 - 7,8              |

## Užitné vlastnosti

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Období hlavního estetickéh... | pozdní léto, podzim a začátek zimy |
|-------------------------------|------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití                     | zelenina, rostlina okrasná listem pěstovaná jako letnička s největším efektem v pozdním létě a na podzim, částečně v zimě (na záhony, do nádob různého typu), také jako rostlina k řezu listových růžic pro floristické účely.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Choroby a škůdci            | nekrózy vnitřních listů hlávek, okrajové nekrózy (spály) listů, bakteriální černá žilkovitost brukvovitých ( <i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> ), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i> ), plíseň brukvovitých ( <i>Peronospora parasitica</i> ), alternáriová skvrnitost brukvovitých ( <i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i> ), květílka zelná ( <i>Delia radicum</i> ), mšice zelná ( <i>Brevicoryne brassicae</i> ), dřepčík ( <i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec ( <i>Ceutorhynchus</i> ), bělásek zelný ( <i>Pieris brassicae</i> ), bělásek řepový ( <i>P. rapae</i> ), můra zelná ( <i>Mamestra brassicae</i> ), můra kapustová ( <i>Lacanobia oleracea</i> ), osenice polní ( <i>Agrotis segetum</i> ), záprředníček polní ( <i>Plutella xylostella</i> ), molice vlašovičnicková ( <i>Aleyrodes proletella</i> ), bejlmorka zelná ( <i>Contarinia nasturtii</i> ), třásněnka ( <i>Trips</i> spp.) |
| Doporučený spon pro výsad.. | rané 0,4 - 0,5 x 0,3 - 0,4 m, polopozdní 0,5 x 0,5, pozdní 0,5 - 0,6 x 0,5 - 0,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Množení

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Generativní a Předpěstování sadby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Množení - poznámka | nejčastěji semeny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odrůdy             | Pro okrasné účely (záhony, pěstování v nádobách, řez) je pěstována řada odrůd: Dle tvaru listu rozpoznáváme dvě skupiny kultivarů: • celokrajný nebo zkadeřený, působí dojmem kompaktní hlávky: a) s velkou růžicí pro záhony a velké nádoby: např. skupina Pigmeon F1 (´Purple Pigeon´ – střed růžice je fialový), b) s malými růžicemi cca 10–15 cm, lodyhy 60–90 cm – např. ´Crane F1´, ´Empire F1´, ´Sinrise F1´ (ve všech barvách) – odrůdy určené k řezu pro floristiku, ´Sunset´ (s fialovou hlávkou) • vykrajovaný až hluboce laločnatý, hlávky jsou široce rozprostřené; např. ´Peacock F1´ Z-B |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)

## Grafické přílohy

