

Taxon Salix caprea

Název taxonu	Salix caprea
Vědecký název taxonu	Salix caprea
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	vrba jíva, vrba obecná
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Salix

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	někdy strom, jinak keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	někdy strom 6-12 m vysoký, jindy keř 2-4 m
Výhony	letorosty zprvu šedě chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy eliptické až široce elipticky obvejčité či někdy vejčité kopinaté, 6-12 cm, slabě pilovité až celokrajné, svrchu svraskalé, rub s žilnatinou hustě bíle chloupkatou, palisty velké a dlouho vytrvávající
Květenství	samčí jehnědy vejčité, 2-3 cm, prašníky zlatožluté, samičí podlouhle vejčité, až 4,5 cm
Plody	tobolka

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - poznámka	světломilná
Faktor vody	suchá stanoviště, vydrží jen dočasné zamokření
Faktor půdy	nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	III-IV - jehnědy - kočičky (kočičková vrba)
Použití	krajinné úpravy, snese městské prostředí, zdevastované plochy a násypy komunikací

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kozí nožka
Množení - poznámka	rozmnožování semenem se téměř neprovádí, nejčastější je množení dřevitými nebo bylinnými řízky, <i>S. caprea</i> 'Pendula' roubujeme (na kozí nožku) na kmínek <i>S. daphnoides</i> nebo <i>S. viminalis</i>
Odrůdy	'Pendula' - keř s větvemi obloukovitě až k zemi převislými, výška do 2 m