

Taxon Cydonia oblonga

Název taxonu	Cydonia oblonga
Vědecký název taxonu	Cydonia oblonga
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill.
Český název	kdouloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Cydonia vulgaris Pers., Pyrus cydonia L.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cydonia

Zařazení

Pěstitelská skupina	Jádrovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom: koruna široce rozložitá, kulovitá až oválná, hustší; keř: široce kalichovitý habitus
Květy	dosti velké (50-60 mm), pětičetné, bílé až narůžovělé, korunní plátky oválné a mírně zvlněné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké až velké (140-200 g) malvice, široce lahvicovité, baňaté, mírně nepravidelné, tvoří vyvýšené hrboly, žluté s šedou plstí, trpké, bohaté na pektiny

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	pozdní (průměr: 25. - 30. května)
-------------------------	-----------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	říjen (skladovatelnost do dubna), sklízí se po zežloutnutí plodů
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor světla - poznámka	vyžaduje dostatek světla
Faktor tepla	teplé a chráněné oblasti, málo mrazuodolná ve dřevě
Faktor půdy	vyžaduje živné, středně těžké, přiměřeně vlhké půdy (nesmí být těžké, suché a vápenité)

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dle potřeby prosvětlovací řez
-----	-------------------------------

Podnož kdouloňové podnože, semenáče jeřábu ptačího pravého

Užitné vlastnosti

Použití	pro vonné plody, výroba pektinu pro přípravu džemů, marmelád, rosolů a past, ovocné destiláty
Choroby a škůdci	odolná proti strupovitosti a padlí
Plodnost	pozdější, střední až velká, často střídavá

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba u vodárny, okolí bunkru\)](#)

Grafické přílohy

