

Taxon Carex sylvatica

Název taxonu	Carex sylvatica
Vědecký název taxonu	Carex sylvatica
Jména autorů, kteří taxon p...	Huds.
Český název	ostřice lesní
Synonyma (zahradnický pou..	Carex maxima Scop.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Carex

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	domácí taxon

Zařazení

Fytocenologický původ	břehy potoků, prameniště, vlhké listnaté lesy,
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	hustě trsnatá tráva s krátkými oddenky, nejčastěji 20 - 40 cm v pěstování
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	tříhranné lodyhy hladké, ve spodní části olistěné, v horní části nicí, dorůstající až 80 cm
Listy	stálezelené, tmavězelené, 3 - 8 mm široké, mírně přehnuté, rýhované, kratší než lodyha
Květenství	řdké, až 80 cm dlouhé, tvořené 3 - 7 oddálenými klásky; vrcholový (samčí) velmi tenký, samičí krátce řapíkaté, převislé. horní přisedlé, dolní stopkaté; vrcholový klas samčí, zbylé samičí. Klasy dlouhé, válcovité, silně obloukovitě ohnuté
Květy	klásky
Plody	mošnišky (perygium - zdánlivý plod) - nažka zabalená v pleve; mošničky 4 - 5,5 mm, delší než plevy, obvejčité s dlouhým 2 zubým zobánkem
Vytrvalost	mrazuvzdorná

Dlouhověkost	dlouhověká trvalka
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	raší v polovině dubna

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	na vhodném stanovišti semení

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	přímé slunce v zimě ji poškozuje - spálené listy
Faktor tepla	bez specifických nároků
Faktor vody	vlhké až čerstvé (ne mokré) půdy
Faktor půdy	na půdu nenáročná, zahradní i méně živná půda
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	zásadité až slabě kyselé půdy

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	skupinové výsadby
Použití	ideální v přírodě podobných VP spolu s jinými stínomilnými trvalkami a kapradinami
Doporučený spon pro výsad..	9 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením brzy na jaře nebo výsevem semen, která klíčí snadno a rychle

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A (A1)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	1998
------------------------------	------

Výsev/výsadba na stanoviš... při zakládání podrostového společenstva
Dodavatel Arboretum a botanická zahrada MENDELU