

Taxon Vitis vinifera Marselan

Název taxonu	Vitis vinifera Marselan
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Marselan’ (Ma)
Český název	Réva vinná pravá
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o francouzskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Cabernet Sauvignon’ x ‘Grenache’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávajcí
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, okrouhlé, pětilaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je slabě puchýřnatý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší válcovitý hrozen, středně hustý; má menší kulaté bobule, modrofialové barvy
Semena	malá, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	Cabernet Sauvignon (Marselan nemá tak hluboké výkroje)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché půdy nejsou vhodné
Faktor půdy	hlinitopísčité i štěrkovité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 7-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má granátovou barvu, výrazné třísloviny a aroma po odrůdě Cabernet Sauvignon
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 81\)](#)

Grafické přílohy

