

Taxon Vitis vinifera Savilon

Název taxonu	Vitis vinifera Savilon
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Savilon’ (Sa)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	BV-19-88
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Rakiš’ (Villard blanc x Veltlínské červené rané) x ‘Merlan’ (Merlot x Seibel 13 666)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světlejší, šedohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, slabě pětilaločnaté s výraznějšími výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, většinou úzce otevřený; povrch listu je zvlněný, hladký
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký, rozvětvený, řidší až středně hustý hrozen; bobule kulatá, malá, žlutozelená na osluněné straně až s bronzovým líčkem
Semena	malá, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech

Možnost záměny taxonu (+..	´Malverina´ (Sa má však řidší hrozen a menší žlutozelené bobule)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	T 5C, SO 4, CR 2 i Kober 125 AA, dle půd a vedení

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vysoká odolnost k houbovým chorobám, vyhledávána roztoči, sprchává
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá až medová; v chuti je lehká kopřiva až angrešt, často velmi lehce vanilková
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133\)](#)

Grafické přílohy



