

Taxon Helleborus purpurascens

Název taxonu	Helleborus purpurascens
Vědecký název taxonu	Helleborus purpurascens
Jména autorů, kteří taxon p...	Valdst. Et Kit
Český název	čemeřice nachová
Synonyma (zahradnicky pou..	Helleborus viridis L. var. purpurascens (Walesy. Et Kit) Kit., Helleborus atrorubens Hook non Walest. et Kit.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Helleborus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Evropa, část střední Evropy; její rozšíření zasahuje až na východní Slovensko - karpatský subendemit.

Zařazení

Fytocenologický původ	podrosty listnatých lesů, především bučin nebo habřin. Roste na flyších, pískovcích a jílovcích, na půdách bohatých na živiny, dostatečně vlhkých a podmáčených.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vytrvalá, 35 cm vysoká bylina
Výhony	květonosná lodyha s 1 – 3 opadavými, celokrajnými, nedělenými listeny
Listy	nepřezimující přízemní listy. Listy alespoň na rubu pýřité, 2 krát dlanitosečné v 5 úkrojků, 2-3(5) klanné. Úkrojky listů jsou stejně dlouhé. Lodyžní listy 3četné (oproti H. viridis užší a delší).
Květy	květonosná lodyha 5 – 20 cm dlouhá, se 2- 3 lupenitými opadavými listy. Květ dlouze řapíkatý, 3 – 7 cm velký, nící. Okvětní lístky nachově fialové, úzké, nepřekrývající se, medníků 5 – 20, nálevkovité.
Plody	zobánkaté měchýřky
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké
Faktor půdy	humózní, živné půdy se zásaditou reakcí
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	cenná pro velmi brzké kvetení
Růstové i jiné druhově spec..	prudce jedovatá - obsahuje jedovaté glykosidy - heleborein, heleborin a helebrin
Doporučený spon pro výsad..	9-12 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Kořenové řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	řízkováním oddenků – oddenky s cca 4 pupeny, dělením trsů, in vitro, semenem. Semeno ke klíčení a zdárnému vývoji vyžaduje specifický teplotní režim. Nejdříve po dobu 6 týdnů vystavení vysokým teplotám 22° C v konstantně vlhké půdě, posléze po dobu 6 – 8 týdnů vystavení nízkým teplotám (-4 až +4 °C)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(přesazena ze stínoviště na podzim 2014\)](#)
- [Z 12: záhon 12 / ZF - Z - Akademická zahrada](#)

Celky sbírek - poznámka D12 - podél starých laboratoří - přesazena ze stínoviště na podzim

Grafické přílohy

