

Taxon *Pyrus communis* 'Clappova červená'

Název taxonu	<i>Pyrus communis</i> 'Clappova červená'
Vědecký název taxonu	<i>Pyrus communis</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Clappova červená'
Český název	hrušeň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Pyrus achras</i> , <i>Pyrus domestica</i> , <i>Pyrus pyraster</i> Borkh.
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Pyrus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Massachussets, USA
-------------------------------	--------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	křížením 'Clappova' x 'Červencová'
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna široce pyramidální až široce jehlancovitá, větve visí až k zemi
Listy	středně velké, oválný až široce vejčitý tvar, tmavě zelené, lesklé s mělce pilovitým okrajem čepele
Květy	středně velké (36-40 mm), široce miskovité, korunní plátky široké, okrouhlé, bílé
Plody	středně velké až velké (160-180 g), baňatě kuželovité, vínově červené, lenticely zahuštěné okolo kalichu, dužnina šťavnatá, sladce nakyslá, mírně aromatická, velmi dobrá

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec srpna (skladovatelnost do konce září)
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	proti mrazu ve dřevě a v květu středně odolná
Faktor půdy - poznámka	nenáročná na půdu a polohu, vyhovují jí hlinité půdy do 450 m nadmořské výšky

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Podnož kdouloň K-TE-B, K-TE-E, MA-SE i semenáč H-TE-1, H-TE-2

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum
Choroby a škůdci	ve vlhčích oblastech napadána strupovitostí
Plodnost	pozdější (7. - 10. rok po výsadbě), hojná, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba hrušní\)](#)

Grafické přílohy

