

Taxon Cotinus coggygria ‘Royal Purple’

Název taxonu	Cotinus coggygria ‘Royal Purple’
Vědecký název taxonu	Cotinus coggygria
Jména autorů, kteří taxon p...	Scop.
Odrůda	‘Royal Purple’
Český název	ruj obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Rhus cotinus L.
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Cotinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Makaronézáská oblast, Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: vyšlechtěn v roce 1911

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, nepravidelně a široce větvený keř až vícekmenný strom, střeň rostoucí, roční přírůstek je 20 až 30 cm, výška kolem 20. roku po výsadbě 2 až 3 m, v 50. letech dosahuje v našich podmínkách výšky 4 až 5 m
Výhony	obloukovitě odstávající, lysé
Pupeny	střídavé
Listy	okrouhlé, až vejčité, střídavé, opadavé, při rašení jsou listy výrazně fialově-červené, později sytě fialové, v polostínu je vybarvení málo výrazné
Květenství	vrcholové laty, 10 -30 cm dlouhé
Květy	malé, žlutozelené či zelenavě bílé, 2–3 mm v průměru
Plody	malé, suché, šikmo obvejčité peckovice

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu listy méně vybarvují do vínova a zůstávají hnědavě zelené
Faktor tepla	Zóna 5 (do - 29 °C)
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách, snáší přísušky
Faktor půdy	na půdy nenáročný, pH neutrální až zásadité
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	nevysazovat na silně vápenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	odstraňování slabých výhonů, při bujném růstu provádíme radikální zmlazení - řez silných větví u země
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického účinku	v průběhu vegetace
Použití	okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Roubování
Množení - poznámka	těžce množitelný druh, nejpoužívanějším způsobem množení je množení kultivaru je bylinnými řízky, doporučuje se používat stimulantů ve formě roztoků s IBA o koncentraci 1000 - 3000 ppm, odběr řízků v červnu, možné je také množení z dřevitých řízků s použitím práškových stimulantů, nebo roubování na semenáče původního druhu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanovišti... 2008

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>

- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,](#)